



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Dezernat Gesundheit
und Verbraucherschutz
Gesundheitsförderung



يرجى مراجعة سجل التطعيمات لطفلك أو
إظهاره لطبيب الأطفال!

* حسب اللقاح المستخدم على فترات لا تقل
عن ٤ أسابيع

* الأطفال الخدج:

جرعة لقاح إضافية عند عمر ٣ أشهر ،
أي ٤ جرعات لقاح في المجموع



In arabischer Sprache

التطعيم	عدد	عمر
الفيروس روتا(عجلي)	٢* ٣	٦ أسابيع-٤ أشهر
كزاز*	٣	شهرين-١١ أشهر(التطعيم الرابع يكون من سن الخامسة إلى ست سنوات)
الخنق*(الديفتريا)*	٣	شهرين-١١ أشهر(التطعيم الرابع يكون من سن الخامسة إلى ست سنوات)
السعال الديكي*	٣	شهرين-١١ أشهر(التطعيم الرابع يكون من سن الخامسة إلى ست سنوات)
شلل الأطفال	٣	شهرين-١١ شهر
الأنفلونزا من النوع ب*	٣	شهرين-١١ شهر
التهاب الكبد ب*	٣	شهرين-١١ شهر
المكورات الرئوية	٣	شهرين-١١ شهر
الحصبة-النكاف والحصبة الألمانية	٢	١١-١٥ شهر
خُمق (جدري الماء)	٢	١١-١٥ شهر
النيسرية السحائية	١	١٢ شهر
التهاب الدماغ المحمول بالقراد (لقاح القراد)	٣	ابتداء من العمر ٣٦ شهر (التطعيم الرابع بعد التطعيم الثالث بثلاث سنوات)
كوفيد-19 (فقط في حالة الأمراض السابقة)	٣	من ٦ أشهر إذا لزم الأمر ، التطعيمات السنوية المنتظمة

حماية التطعيم الحالية لطفلك في مركز الرعاية النهارية

وفقاً لتوصيات لجنة التطعيم الدائمة في معهد
روبرت كوخ (STIKO)

يجب إجراء التطعيمات بشكل كامل وفي
الوقت المناسب وفقاً لقانون الوقاية ، يجب
على الأوصياء القانونيين تقديم دليل على
الإستشارة التطعيم الطبي عند دخول طفلهم
إلى مركز الرعاية النهارية.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقاً لقانون الحماية من
الحصبة ، يجب تقديم دليل على الحماية
الكافية من التطعيم ضد الحصبة.

هل لم يتم تطعيم طفلك بشكل مناسب لسنه؟
(انظر الجدول) ، نوصيك بمتابعة التطعيمات
المفقودة في أسرع وقت ممكن.