



## Aktueller Impfschutz Ihres Kindes in der Kindertagesstätte

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) sollten Impfungen vollständig und zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.

Erziehungsberechtigte müssen bei Aufnahme Ihres Kindes in die Kita laut Präventionsgesetz einen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorlegen.

Darüber hinaus ist nach dem Masernschutzgesetz ein ausreichender Masern-Impfschutz nachzuweisen.

Ist Ihr Kind nicht altersentsprechend geimpft (siehe Tabelle), empfehlen wir Ihnen die fehlenden Impfungen **schnellstmöglich nachzuholen**.

Impfung	Anzahl	im Alter von
Rotaviren	2 – 3*	6 Wochen – 4 Monaten
Tetanus (Wundstarrkrampf) <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 – 6 Jahren)
Diphtherie <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 – 6 Jahren)
Pertussis (Keuchhusten) <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 – 6 Jahren)
Poliomyelitis (Kinderlähmung) <sup>a</sup>	3	2 - 11 Monaten
Hämophilus influenzae Typ b (Hib) <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten
Hepatitis B <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten
Pneumokokken <sup>a</sup>	3	2 – 11 Monaten
Masern, Mumps, Röteln	2	11 – 15 Monaten
Windpocken (Varizellen)	2	11 – 15 Monaten
Meningokokken C	1	12 Monaten
FSME („Zecken“- Impfung)	3	Sinnvoll ab 36 Monaten (4. Impfung drei Jahre nach der 3. Impfung)
COVID-19 (nur bei Vorerkrankungen)	3	Ab 6 Monaten, ggf. jährliche Auffrischimpfungen



**Bitte kontrollieren Sie das Impfbuch Ihres Kindes oder legen Sie es Ihrem Kinderarzt vor!**

*\* je nach verwendetem Impfstoff im Abstand von mind. 4 Wochen  
<sup>a</sup> Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen*