



Παιδικός εμβολιασμός για τους παιδικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολίων του Ινστιτούτου «Robert- Koch» (STIKO), τα εμβόλια πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένα και στην κατάλληλη ηλικία.

Οι γονείς και κηδεμόνες υποχρεούνται, βάσει του Νόμου Πρόληψης Ασθενειών, να προσκομίσουν κατά την εγγραφή στον παιδικό σταθμό ιατρική βεβαίωση σύστασης εμβολιασμού (ärztliche Impfberatung).

Επιπλέον, βάσει του Νόμου κατά της Ιλαράς, απαιτείται αποδεικτικό- βεβαίωση επαρκούς εμβολιασμού του παιδιού κατά της Ιλαράς.

Στην περίπτωση που το παιδί σας δεν έχει εμβολιαστεί ανάλογα της ηλικίας του (βλ. Πίνακα), σας συνιστούμε να προβείτε **το συντομότερο δυνατό** στους εμβολιασμούς που έχουν παραλειφθεί.

Εμβόλιο	Δόσεις	Ηλικία
Ροταϊοί	2 – 3*	6 εβδομάδων – 4 μηνών
Τέτανος ^a	3	2 – 11 μηνών (4 ^η δόση σε ηλικία 5-6 χρονών)
Διφθερίτιδα ^a	3	2 – 11 μηνών (4 ^η δόση σε ηλικία 5-6 χρονών)
Κοκκύτης ^a	3	2 – 11 μηνών (4 ^η δόση σε ηλικία 5-6 χρονών)
Πολιομυελίτιδα ^a	3	2 - 11 μηνών
Αιμόφιλο ινφλουένζας τύπου B (Hib) ^a	3	2 – 11 μηνών
Ηπατίτιδα Β ^a	3	2 – 11 μηνών
Πνευμονιόκοκκος ^a	3	2 – 11 μηνών
Ιλαρά, Ερυθρά, Παρωτίτιδα (Μαγουλάδες)	2	11 – 15 μηνών
Ανεμοβλογιά	2	11 – 15 μηνών
Μηνιγγιτιδόκοκκος τύπου C	1	12 μηνών
FSME (εμβόλιο κατά των τσιμπουριών)	3	Ενδείκνυται από 36 μηνών (η 4 ^η δόση 3 χρόνια μετά την 3 ^η δόση)
COVID-19 (μόνο με υποκείμενα νοσημάτα)	3	Από 6 μηνών, κατά περίπτωση αναμνηστική δόση κάθε χρόνο



**ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ
ΒΙΒΛΙÁRIO
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ Η
ΔΕΙΞΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΑΣ!**

** αναλόγως του εμβολίου που χρησιμοποιείται ανά διαστήματα τουλάχιστον 4 εβδομάδων
^a πρώωρα βρέφη: μία επιπλέον δόση σε ηλικία 3 μηνών, δηλ. συνολικά 4 δόσεις*