



Anaokulundaki Çocuğunuzun Aktüel koruyucu aşısı

Daimi aşı komitesi, Robert-Koch-Enstitüsü (STIKO)'ya göre, aşıların tamamı ve zamanında yapılmalı.

Önlem yasasına göre, Çocuğunuzun kreşe kabulünde, bugüne kadar ebeveynini Doktordan Aşı ile ilgili danışma raporu sunmak zorundaydı.

Ayrıca Kızamıktan Korunma Yasasına uygun şekilde Cocuğunuzun kızamığa karşı aşılandığı veya bağışıklığa sahip olduğu belgelendirilmek zorundadır.

Eğer çocuğunuza kendi yaş gurubuna uygun aşı yapılmamış ise (tabloya bakın), **en kısa sürede eksik aşıları tamamlamanızı** tavsiye ederiz.

İmpfung	Anzahl	im Alter von
Rota Virüsü	2 – 3*	6. hafta ile 4. aylık
Tetanos ^a	3	2. – 11. aylık (4. aşılama 5-6 yaşlarında)
Difteri ^a (kuşpalazı)	3	2. – 11. aylık (4. aşılama 5-6 yaşlarında)
Pertussis (Boğmaca) ^a	3	2. – 11. aylık (4. aşılama 5-6 yaşlarında)
Polio (Çocuk Felci IPV) ^a	3	2. – 11. aylık
(Hib) Hastalığı ^a	3	2. – 11. aylık
Hepatit B ^a	3	2. – 11. aylık
Pneumokokken ^a Pnömonok (Zatürre)	3	2. – 11. aylık
Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık (MMR aşısı)	2	11.– 15. aylık
Suçiçeği	2	11. – 15. aylık
Meningokokken C (Meningokok menenjit)	1	12. aylık
FSME („Kene aşısı“)	3	36. aydan sonra yaptırmak mantıklı
COVID-19 (yalnızca altta yatan hastalığı olan Çocuklar için)	3	6. aylık dan itibaren (gerektiği takdirde yıllık hatırlatma dozu)



**Lütfen çocuğunuzun
aşı karnesini kontrol
edin veya çocuk
doktorunuza
gösterin!**

* Kullanılan aşıya bağlı olarak, en az 4 hafta arayla

^a *erken doğanlarda* 3 aylıkken ek aşı dozu, yani toplam 4 aşı dozu