



Актуальна вакцинопрофілактика Вашої дитини в дитячому садку

Згідно з рекомендаціями Постійної комісії з питань вакцинації при Інституті Роберта Коха (STIKO), щеплення повинні робитися в повному обсязі та своєчасно.

Згідно з Законом про профілактику, законні опікуни при прийомі їхньої дитини в дитячий садочок повинні надати підтвердження про проходження медичної консультації з вакцинації.

Крім того, відповідно до Закону про захист від кору, необхідно надати підтвердження про повну вакцинацію від кору.

Якщо Ваша дитина не отримала необхідну для свого віку вакцинацію, ми рекомендуємо Вам **якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.**

Вакцинація	Кількість	У віці
Ротавірус	2 – 3*	6 тижнів – 4 місяці
Правець (стобняк, тетанус) ^a	3	2 – 11 місяців (4-е щеплення у віці 5 – 6 років)
Дифтерія ^a	3	2 – 11 місяців (4-е щеплення у віці 5 – 6 років)
Кашлюк (спазматичний кашель) ^a	3	2 – 11 місяців (4-е щеплення у віці 5 – 6 років)
Поліомієліт (дитячий параліч) ^a	3	2 – 11 місяців
Гемофільна інфекція типу b (Hib) ^a	3	2 – 11 місяців
Гепатит B ^a	3	2 – 11 місяців
Пневмококова інфекція ^a	3	2 – 11 місяців
Кір, епідемічний паротит («свинка»), краснуха	2	11 – 15 місяців
Вітряна віспа («вітрянка»)	2	11 – 15 місяців
Менінгококова інфекція серогрупи C	1	12 місяців
FSME (щеплення від кліщового енцефаліту)	3	має сенс з 36 місяців (4-е щеплення через 3 роки після 3-ї вакцинації)
COVID-19 (тільки при супутніх захворюваннях)	3	з 6-ти місяців, при необхідності щорічні ревакцинації



**Проконтролюйте,
будь ласка,
книжку щеплень
Вашої дитини
або покажіть її
Вашому
дитячому лікарю!**

** в залежності від використовуваної вакцини, інтервал повинен бути не менше 4-ох тижнів*

^a недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3-ьох місяців, тобто загалом 4 дози вакцини